


Памятка для родителей пациента после операции при гипоспадии

Мы можем выписать маму с ребенком через несколько дней после операции на домашнее лечение, когда ситуация станет стабильной.

ВАЖНО! В первую неделю после операции Вам следует позвонить в отделение, если:

- Ваш ребенок испытывает сильную боль и обезболивание не помогает;
- из места операции есть какие-либо выделения;
- повязка спадает;
- выделяется большое количество мочи, при этом из катетера уменьшается или прекращается;
- катетер выпадает.

УХОД ЗА КАТЕТЕРОМ И ПОВЯЗКОЙ



После операции в уретре будет находиться гибкая пластиковая трубка (катетер), также будет большая повязка, закрывающая половой член. Катетер и повязку необходимо оставить на 7-12 дней после операции (зависит от вида проведенной операции, это определит врач).

Вашему ребенку не следует принимать ванну или душ до тех пор, пока не будут удалены катетер и повязка. Если повязка испачкалась во время смены подгузников, аккуратно промокните ее влажной салфеткой.

Катетер будет отводить мочу в два подгузника – один поверх другого – чтобы повязка оставалась сухой. Он также обеспечивает дополнительную защиту области во время заживления. Если ваш сын больше не в подгузниках, катетер будет присоединен к мочеприемнику (специальному мешку).



ЛЕКАРСТВА

Вполне正常но, что ваш ребенок чувствует себя некомфортно в течение дня или двух после операции. Мы рекомендуем давать парацетамол каждые 4-6 часов согласно инструкции. Вам не нужно будить ребенка ночью, чтобы дать препарат.

Катетер может раздражать внутреннюю часть мочевого пузыря вашего ребенка, вызывая «спазмы мочевого пузыря». Эти спазмы напоминают боль в животе или дискомфорт в области полового члена или нижней части. Обезболивающие, спазмолитики, которые вы сможете дать вашему ребенку устраниют проблему.

Запор может усугубить спазмы, поэтому убедитесь, что ваш ребенок придерживается сбалансированной диеты и пьет много жидкости. После операции существует небольшой риск инфекции, поэтому Вашему ребенку следует выполнять все пункты рекомендаций выписки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ваш ребенок не должен сидеть верхом или оседлать игрушки, такие как велосипеды, по крайней мере, в течение недели после операции. Ему не следует посещать детский сад или школу до тех пор, пока не будут удалены катетер и повязка.

Возвращение в больницу для снятия повязки и катетера

Вам нужно будет вернуться в больницу в указанную дату после операции, чтобы мы могли удалить повязку и катетер. Это будет проводиться в перевязочном кабинете. Снятие повязки и катетера может быть неприятным, поэтому мы рекомендуем утром дать вашему сыну максимальную дозу обезболивающего лекарства в соответствии с инструкциями на флаконе.

Однако не давайте дозу лекарства от спазма мочевого пузыря. После снятия повязки пенис вашего сына станет красным и опухшим. Это нормально и пройдет через 1-2 недели. Мы порекомендуем вам мазь, которую вы сможете нанести на пенис вашего сына на следующие несколько недель. Это мазь с антибиотиком, которая снижает риск развития инфекции. Пожалуйста, возьмите его с собой на прием после выписки, чтобы мы могли показать вам, как её применять.

Что будет дальше? Врач примет вашего ребенка на осмотр примерно через месяц после операции.

ВАЖНО! Вам следует обратиться в приемное отделение или к своему врачу раньше, если:

- Ваш ребенок испытывает сильную боль, и обезболивание не помогает.
- Место операции выглядит красным, опухшим и кажется более горячим, чем окружающая кожа.
- Есть какие-либо выделения из места операции.
- Если повышается температура.
- Имеются проблемы с мочеиспусканием.